

일반의약품

생리통에 효과 빠른 액상형 진통제

탁센 이브

연립캡슐
이부프로펜·파마부론

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고, 사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

유효성분 : 이부프로펜 (IP)..... 200 mg
파마부론 (USP)..... 25 mg

첨가제 (동물유래성분) : 속신산젤라틴 (돼지, 가축)
기타 첨가제 : 락트소, 부분탈수우동소르비톨, 부틸하이드록시톨루엔, 수산화칼륨, 정제수, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜

【성상】 미황색 투명한 내용물을 함유한 분홍색 투명한 타원형 연립캡슐

【효능·효과】

- 1. 두통, 치통, 발치후 통증(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨결림), 타박통, 골절통, 염좌통(뱀통증), 월경통(생리통), 외상통의 진통
- 2. 오피오이드 계열의 중독, 발열시의 해열

【용법·용량】

- 만 15세 이상 및 성인 : 1일 1~3회, 1회 1~2캡슐 4시간 이상 간격
- 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1일 1~3회, 1회 1캡슐 4시간 이상 간격
- 만 8세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1일 1~2회, 1회 1캡슐 6시간 이상 간격
공복(빈 속)을 피하여 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
- 2) 심혈관계 위험 : 조절되지 않는 고혈압, 울혈심부전증(NYHA II-III), 확립된 허혈성 심장질환, 말초동맥질환, 뇌혈관질환을 가진 환자들은 신중히 고려하여 이부프로펜을 사용하여야 하며 고용량 이부프로펜(1일 2400 mg) 사용을 피해야 합니다. 또한 심혈관계 위험 요소(예, 고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 흡연)를 가지고 있는 환자가 고용량 이부프로펜(1일 2400 mg)이 필요한 경우 장기간 치료를 시작하기 전에 신중히 고려해야 합니다. 임상연구 결과 고용량(1일 2400 mg) 이부프로펜 사용이 동맥 혈전 증상(심근경색증 또는 뇌졸중)에 대한 위험성을 다소 증가시킬 수 있다고 나타났습니다. 종합적으로 역학연구 결과 저용량 이부프로펜(예, 1일 1200 mg 이하)과 동맥 혈전 증상의 위험성 증가간의 연관성은 증명되지 않았습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기와 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

- 1) 수술 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로) 의사와 상의하십시오.
- 2) 만 3개월 이상 만 1세 미만의 영아(갓난아기)는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 바람직합니다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통,

음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 기려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간질질환, 신장(콩팥)질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 고령자(노인)
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 10) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이노제를 복용하는 사람
- 11) 심근경색이나 뇌졸중 예방 목적으로 저용량 아스피린을 복용하는 사람이 약은 아스피린의 효과를 감소시키고, 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험을 증가시킬 수 있습니다. 실험실적 자료에서 이부프로펜과 아스피린(아세틸살리실산) 병용투여시 이부프로펜이 저용량 아스피린의 혈소판 응집 효과를 억제할 수 있다고 나타났습니다. 이 데이터 외상법에 대해 임상적으로 확실성이 존재하지만 일반적 또는 정기간 이부프로펜 사용 시, 저용량 아스피린의 심장 보호 효과가 감소될 수 있습니다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적(출혈에 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 어지러움, 부종(부기)
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - ① 아나필락시스(과민성쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
 - ② 피부점막안정후군(스티븐스-존슨증후군, 중독성표피괴사증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(출혈에 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있습니다.
 - ③ 천식
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 4) 광민감 반응(빈도불명), 빈도불명의 호산구 증가 및 전신 중후군을 동반한 약물 발진(DRESS 증후군)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 이 약의 과량 복용 시 대사산증이 나타날 수 있습니다.

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜주세요.
- 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 복용 시에는 음주하지 마십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【포장단위】 10캡슐/PTP

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 햇빛을 받는 경우 변색되므로 반드시 차광하시기 바랍니다.

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변태, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2019년 5월 22일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

※ 이 포장은 어린이 보호용 안전포장입니다.

제조업체 및 판매자



GC 녹십자
【주] 녹십자
충청남도 음성군 금암읍 무곡로55번길 28
TEL. 010-800-8888 FAX 010-260-0033
www.greencross.com

제조사

【주]알피바이오

경기도 화성시 행안읍 제약광안길 35-7